

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви” Бијељина Српске војске 53			УП-10-125
Упутство за поступање са висококонтаминираним отпадом				
Страна 1 од 3	Издање:	Важи од:	Одобрио надлежни помоћник	Копија број
	2	2023-02-13	др Немања Јанковић, помоћник директора	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством дефинише се поступак са висококонтаминираним отпадом који настаје у Ковид болници 1, 2, 3 Јавне здравствене установе Болнице „Свети Врачеви“ Бијељина, у даљем тексту Болница Бијељина у вријеме инфекције КовИД2 вирусом.

1.2 Подручје примјене

Ово упутство се примјењује у Ковид болници 1, 2, 3 и просторији за збрињавања медицинског отпада.

1.3 Надлежности за примјену

За примјену овог документа одговоран је Виши техничар за медицински отпад, а дужни су га познавати сви радници укључени у процес настанка и дистрибуције отпада.

1.4 Искључења

- Нема.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1. Референтни документи

- Закон о управљању отпадом Службени гласник Републике Српске - важеће издање;
- Закон о здравственој заштити;
- Програм мјера за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите – важеће издање.
- Правилник о управљању медицинским отпадом у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ Бијељина;
- Стандарди за сертификацију и акредитацију здравствених установа РС;
- План и правила управљања отпадом у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ Бијељина

2.1 Остали документи

- УП-10-047: Упутство за руковање оштрим предметима,
- УП-10-125: Упутство за поступање са висококонтаминираним отпадом,
- ПР-10-013 Поступак организовања и спровођења обуке запослених.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

- ЛЗО – лична заштитна опрема.

4. ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА)

4.1 Поступак збрињавања висококонтаминираног медицинског отпада

Радник на постројењу (техничар за медицински отпад) и радник на одржавању хигијене (спремачица) при раду са висококонтаминираним медицинским отпадом морају носити ЛЗО, ту спада:

- Непромочиви заштитни комбинезон;

Болница Бијељина	Страна 2 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-125
		2	2023-02-13	

- Непромочива кецеља;
- Заштита за очи (наочаре / визири);
- Маске;
- Капе;
- Два пара рукавица;
- Заштитна обућа (чизме, каљаче).

У просторијама Ковид болнице¹, 2, 3 постављене су канте са поклопцем за одлагање висококонтраминираниог медицинског отпада који је настао при раду са пацијентима код којих постоји сумња или су заражени вирусом КовИД. У канту је постављена сива кеса (специјална кеса за стерилизацију) која се прије одвожења у Ковид болницу дезинфикује у постројењу за третман медицинског отпада раствором хлорног препарата.

Транспорт висококонтраминираниог отпада врши се у тачно одређено вријеме. Приликом преузимања канти са висококонтраминираним медицинским отпадом спремачица заврне поклопац на канти, и транспортује се у постројење за третман медицинског отпада.

Сива кеса мора бити постављена тако да дио кесе буде пресавијен преко контејнера, а све жуте кесе са инфективним отпадом које се убацују у контејнер не смију се везивати, да не би дошло до хаварије приликом процеса стерилисања.

Када се висококонтраминирани отпад доведе у постројење за прераду медицинског отпада врши се дезинфекција канте са вањске стране хлорним препаратом, као и дезинфекција садржаја сиве кесе прскањем по површини. Након тога исти се одмах стерилише (тј. претвара се из инфективног у комунални на 100°C). Након пражњења садржаја врши се механичко прање детерџентом канти и колица за транспорт, затим се испирају врућом водом, и на крају дезинфикују хлорним препаратом. Техничар за медицински отпад свакодневно прави овај препарат у складу са упутством произвођача, и издаје га перачима рубља који раде у просторијама старог вешераја, и радницима Техничке службе који спроводе дезинфекцију Ковид болнице и осталих просторија нове и старе болнице према дефинисаном плану. У свесци (образац у слободној форми) води се евиденција о количини направљеног и издатог хлорног препарата.

Радници који су укључени у поступак збрињавања висококонтраминираниог медицинског отпада морају поштовати мјере заштите ширења заразних болести придржавајући се следећих корака:

1. Одржавати социјалну дистанцу (најмање 1 метар) од друге особе, а од особе са респираторним симптомима (најмање 2 метра).
2. Више пута у току дана руке прати сапуном и водом или користити дезинфицијенс на бази алкохола, након сваког контакта са запрљаним вешом или поглогом.
3. Након прања руку за посушивање користити папирни убрус за једнократну употребу. Уколико убрус није доступан, користити пешкире али их мијењати чим постану влажни.
4. Носити маску код појаве респираторних симптома, и спроводити хигијену руку након оладагања маске.
5. Избјежавати додиривање лица, уста и очију рукама.
6. Спровођење респираторне хигијене кашљања или кијања у убрус, а затим одмах одлагати убрус у канту.
7. Редовно провјетравати просторије, најмање 2 пута дневно.

Болница Бијељина	Страна 3 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-125
		2	2023-02-13	

8. Најмање 2 пута дневно чистити све додирне површине дезинфекционим средством (Инцидин фоам, Супра Алл, Алкохол 70%).
9. Чишћење просторија постројења за медицински отпад - врши се после сваког пријема отпада (Инцидин Про 1% или Изосан)
10. Дезинфекција просторија за медицински отпад обавља се сваког дана ујутру у 06 часова са распршивачем у који је растворено дезинфекционо средство на бази хлора (Медикарине таблете) и овај посао обављају радници Техничке службе.

